

BRONHOSKOPIJA

Što je bronhoskopija?

Bronhoskopija je pretraga pomoću koje liječnik može pregledati vaše bronhe i uzeti odgovarajuće uzorke iz njih za dodatne laboratorijske pretrage.

Pregled se vrši pomoću savitljivog instrumenta (bronhoskopa). Ako se odluči da je potrebna pretraga krutim (metalnim) bronhoskopom, o tome ćemo vas posebno obavijestiti. Cijev tog instrumenta je promjera 6 mm. Nju liječnik uvodi kroz vaš nos ili usta u donje dišne putove. Kada je cijev postavljena kroz nju liječnik pregledava unutrašnjost vaših dišnih putova. Pretraga nije bolna, no može izazvati nelagodu u nosu i grlu, kašalj i nagon na povraćanje.

Ova pretraga je potrebna radi postavljanja točne dijagnoze i odluke o vašem optimalnom liječenju.

Što me očekuje kada dođem na pretragu?

Prije početka pretrage, sestra će vam postaviti nekoliko pitanja o vašim prethodnim bolestima, lijekovima koje trenutno uzimate i alergijama. Ako imate slušni aparat nosite ga tijekom pretrage. Ako nosite zubnu protezu, trebat ćete je skinuti. Sestra će vam izmjeriti tlak i moguće (nije obavezno za sve bolesnike) dati injekciju u mišić.

Kako teče pretraga?

Sestra će vas posjeti u stolicu ili poleći na krevet (ako ne možete sjediti), a liječnik će vam pomoći spreja anestezirati ždrijelo i glasnice, kako bi pretraga bila ugodnija. Zatim će vam liječnik kroz nos ili usta uvesti cijev bronhoskopa u dišne putove. Nakon dodatne anestezije kroz bronhoskop, vrši se pregled i liječnik uzima uzorke za dodatne laboratorijske pretrage.

Što se događa nakon bronhoskopije?

Nakon pretrage dva sata nećete smjeti ništa jesti ni piti, jer su vam refleksi gutanja oslabljeni nakon anestezije i mogli biste se zagrcnuti.

Poželjno je da vas netko odveze kući automobilom, jer nakon pretrage, nekoliko sati ne smijete sami voziti.

Nekoliko dana nakon bronhoskopije možda ćete osjećati nelagodu u grlu i možete imati tragove krvi u iskašljaju, što vas ne mora zabrinjavati.

Što morate zapamtiti?

- Pet dana prije zakazane bronhoskopije nemojte uzimati lijekove koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (Andol, Aspirin)
- Nemojte jesti niti piti od ponoći ako vam je bronhoskopija zakazana za taj dan. Ako vam je želudac prazan, manja je vjerojatnost mučnine i povraćanja.

- Ako imate redovito propisanu terapiju, koju uzimate ujutro, uzmite je rano ujutro s malo tekućine
- Ako ste dijabetičar, zatražite dodatne upute.
- Ne smijete voziti nakon pretrage. Organizirajte si povratak kući nakon bronhoskopije.
- Na pregled donesite:
 - dosadašnju medicinsku dokumentaciju i rendgenske slike
 - zatražene nalaze pretraga koje se vrše kao priprema za bronhoskopiju (krvna slika, testovi zgrušavanja krvi, plinska analiza arterijske krvi i EKG)
 - popis lijekova koje uzimate
 - ako imate alergiju popis tvari lijekova na koje ste alergični
 - zdravstvenu knjižicu i odgovarajuću uputnicu izdanu sa strane vašeg liječnika obiteljske medicine.