



KLNIKA ZA OČNE BOLESTI
KLNIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Predstojnik: Doc.dr.sc. Tomislav Jukić

UKLANJANJE IZRASLINE NA VJEĐI/PERIOKULARNOM PODRUČJU

Poštovani,

Uklanjanje izrasline na vjeđi/ periokularnom području je kirurški zahvat kojim se uklanja izraslina nepoznatog podrijetla. Uklanjanjem navedene tvorbe i njenom patohistološkom analizom dolazimo do konačne dijagnoze, a time i do neophodnih informacija za Vaše , eventualno, daljnje liječenje.

KAKO SE ZAHVAT IZVODI?

Operacija se obavlja u lokalnoj/lokalnoj-potenciranoj/općoj anesteziji. Novotvorina se odstrani te se zdravo tkivo rekonstruira po slojevima. Odstranjeni materijal pošalje se na patohistološku analizu. Cijeli postupak traje u prosjeku 60 minuta. Nakon zahvata potrebno je mirovanje u krevetu 2-3 sata uz nošenje kompresivnog zavoja.



Primjer izrasline ruba vjeđe



Stanje po eksiciji tumora



Stanje po završetku operacije



Šesti tjedan po operaciji tumor

KAKO MI ODSTRANJENJE IZRASLINE MOŽE POMOĆI I ŠTO AKO SE NE PROVEDE?

Navedenim postupkom se nastoji u cijelosti ukloniti tumorsko tkivo što u nekim slučajevima znači izlječenje; u drugim ograničenje tumorskog rasta i smanjenje dodatnog, lokalnog oštećenja okolnog, zdravog tkiva. Ukoliko se navedeni zahvat ne provede, moguće je daljnje lokalno i sistemsko širenje (metastaziranje) tumora.

MOGUĆI RIZICI

Krvarenje iz mesta reza, ali ta krvarenja su obično manja i osim pritiska za zaustavljanje ne zahtijevaju druge mjere. Zavisno o veličini novotvorine i opsežnosti zahvata, u poslijeoperacijskom razdoblju može nastati značajna asimetrija lica u odnosu na drugu. Ovisno o kozmetskom i funkcionalnom rezultatu, dosnosi se odluka o eventualnoj naknadnoj kirurškoj korekciji navedenog. Rjeđe u kasnjem poslijeoperacijskom periodu nastane upala i ožiljkasta deformacija tkiva koja zahtijeva kiruršku korekciju.

**MOGUĆNOSTI ZAMJENE ZA
PREPORUČENI POSTUPAK:**

**ODREĐENI TIPOVI
NOVOTVORINA OSJETLJIVI SU NA
RADIO I/ILI KEMOTERAPIJU.**